

Vacunas recomendadas para la infancia



	Nacimiento	2 MESES	4 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	4-5 AÑOS	11-12 AÑOS	13-18 AÑOS
Anticuerpo del RSV	Depende del estado de salud del niño										
HepB Hepatitis B	HepB	Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV							
RV* Rotavirus		RV	RV	RV							
DTap Difteria, tos ferina y tétanos		Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV							
Hib* <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b		Hib*	Hib*	Hib*			Infanrix DTap		Kinrix DTap/IPV	Tdap	
PCV20 Enfermedad neumocócica		PCV20	PCV20	PCV20		PCV20					
IPV Poliomielitis		Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV	Pediarix DTap- Hep B-IPV					Kinrix DTap/IPV		
MMR Sarampión, paperas y rubeola						MMR			ProQuad MMR/ Varicela		
Varicela Varicela							Varicela		ProQuad MMR/ Varicela		
HepA° Hepatitis A						HepA°		HepA°			
HPV Virus del papiloma humano										HPV	HPV
MenB Bacteria meningocócica B											MenB mayores de 16 años
Menveo Enfermedad meningocócica										Menveo	Menveo
COVID-19** Enfermedad del coronavirus 2019					COVID-19**	COVID-19**	COVID-19**	COVID-19**	COVID-19**	COVID-19**	COVID-19**
Flu+ Gripe					Flu+	Flu+	Flu+	Flu+	Flu+	Flu+	Flu+

NOTAS A PIE DE PÁGINA

RV* La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de la vacuna del Hib o rotavirus que se haya usado en la dosis anterior.

COVID-19** La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y del tipo de vacuna del COVID-19 que se use.

Flu+ anual Las vacunas se administran entre agosto y abril. Se recomiendan dos dosis, con un intervalo de al menos 4 semanas entre ellas, para niños de entre 6 meses y 8 años que reciben la vacuna de la gripe por primera vez y para algunos otros niños de este grupo de edad.

HepA° Se necesitan dos dosis de la vacuna Hep A para una protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y los 23 meses de edad. Ambas dosis deben administrarse con un intervalo de al menos 6 meses. Los niños mayores de 2 años que no hayan recibido las dos dosis de la vacuna Hep A deben completar la serie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Si su hijo no recibe una vacuna recomendada para su edad, hable con el médico de su hijo lo antes posible para saber cuándo se le puede poner la vacuna que no recibió.
2. Si su hijo tiene alguna condición médica que lo ponga en riesgo de contraer una infección (p. ej., anemia falciforme, infección por VIH, implantes codiales) o viajar fuera de Estados Unidos, hable con el médico de su hijo sobre las vacunas adicionales que pudiera necesitar.

Hable con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre alguna vacuna recomendada para él.

Tabla adaptada a partir de las directrices del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y American Academy of Pediatrics.

Enfermedades y las vacunas que las previenen

ENFERMEDAD	VACUNA	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR	SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD	COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD
RSV Virus respiratorio sincitial	RSV Esta vacuna protege del RSV	Se propaga por el aire y por contacto directo	Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones.	Infección de los pulmones (neumonía) y de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones; especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños
Hepatitis B	HepB Esta vacuna protege de la hepatitis B.	Contacto con la sangre o los fluidos corporales	Es posible que no haya síntomas, fiebre, dolor de cabeza, debilidad, vómito, ictericia (piel y ojos amarillos), dolor articular	Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, muerte
Rotavirus	RV Esta vacuna protege del rotavirus.	Por vía oral	Diarrea, fiebre, vómito	Diarrea grave, deshidratación, muerte
Difteria	DTap* Esta vacuna protege de la difteria.	Aire, contacto directo	Dolor de garganta, fiebre leve, debilidad, glándulas inflamadas en el cuello	Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis, muerte
Tos ferina (pertussis)	DTap* Esta vacuna protege de la tos ferina (pertussis).	Aire, contacto directo	Tos intensa, escurrimiento nasal, apnea (pausa en la respiración en bebés)	Neumonía (infección en los pulmones), muerte
Tétanos	DTap* Esta vacuna protege del tétanos.	Exposición mediante cortes en la piel	Rigidez en los músculos del cuello y el abdomen, dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre	Huesos rotos, dificultad para respirar, muerte
Haemophilus Influenzae tipo B	Hib Esta vacuna protege de la Haemophilus Influenzae tipo b.	Aire, contacto directo	Es posible que no haya síntomas a menos que las bacterias entren en la sangre	Meningitis (infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal), discapacidad intelectual, epiglotitis (infección potencialmente mortal que puede obstruir la tráquea y provocar graves problemas respiratorios), neumonía (infección en los pulmones), muerte
Enfermedad neumocócica	PCV Esta vacuna protege de la enfermedad neumocócica.	Aire, contacto directo	Es posible que no haya síntomas, neumonía (infección en los pulmones)	Bacteriemia (infección de la sangre), meningitis (infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal), muerte
Poliomielitis	IPV Esta vacuna protege de la poliomielitis.	Aire, contacto directo, por vía oral	Es posible que no haya síntomas, dolor de garganta, fiebre, náuseas, dolor de cabeza	Parálisis, muerte
Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)	COVID-19 Esta vacuna protege de las complicaciones graves de la enfermedad del coronavirus 2019.	Aire, contacto directo	Es posible que no haya síntomas, fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal, diarrea, vómito, pérdida reciente del gusto o del olfato	Neumonía (infección en los pulmones), insuficiencia respiratoria, coágulos en la sangre, trastorno hemorrágico, lesión en el hígado, el corazón o el riñón, síndrome inflamatorio multistémico, síndrome post-COVID, muerte
Influenza (gripe)	Flu Esta vacuna protege de la influenza.	Aire, contacto directo	Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, fatiga extrema	Neumonía (infección en los pulmones), bronquitis, infecciones de los senos paranasales, infecciones de oído, muerte
Sarampión	MMR** Esta vacuna protege del sarampión.	Aire, contacto directo	Sarpullido, fiebre, tos, escurrimiento nasal, conjuntivitis	Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones), muerte
Paperas	MMR** Esta vacuna protege de las paperas.	Aire, contacto directo	Glándulas salivales inflamadas (debajo de la mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular	Meningitis (infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal), encefalitis (inflamación del cerebro), inflamación de los testículos o los ovarios, sordera, muerte
Rubeola	MMR** Esta vacuna protege de la rubeola.	Aire, contacto directo	A veces sarpullido, fiebre, ganglios linfáticos inflamados	Muy grave en mujeres embarazadas; puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro y defectos de nacimiento
Varicela	Varicela Esta vacuna protege de la varicela.	Aire, contacto directo	Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre	Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones), muerte
Hepatitis A	HepA Esta vacuna protege de la hepatitis A.	Contacto directo, alimentos o agua contaminados	Es posible que no haya síntomas, fiebre, dolor de estómago, pérdida del apetito, fatiga, vómito, ictericia (piel y ojos amarillos), orina oscura	Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones), trastornos en los riñones, el páncreas y la sangre, muerte
Virus del papiloma humano	HPV Esta vacuna protege del virus del papiloma humano.	Se transmite con mayor frecuencia mediante contacto sexual	Es posible que no haya síntomas, verrugas genitales, protuberancias más oscuras dispersas, crecimientos que pueden ser elevados, planos, lisos o ásperos	Cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, incluyendo cáncer de vulva, vagina, pene o ano, y cáncer orofaríngeo
Bacteria meningocócica B	MenB Esta vacuna protege de la bacteria meningocócica b.	Aire, contacto directo	Fiebre y escalofríos, fatiga, vómito, manos y pies fríos, dolores intensos, respiración rápida, diarrea	Pérdida de extremidades, sordera, problemas del sistema nervioso, daño cerebral
Enfermedad meningocócica	Menveo Esta vacuna protege de la enfermedad meningocócica.	Intercambio de secreciones respiratorias y de la garganta	Fiebre repentina, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómito, mayor sensibilidad a la luz y confusión.	Pérdida de extremidades, sordera, problemas del sistema nervioso, daño cerebral

* La vacuna DTaP combina la protección de la difteria, el tétanos y la tos ferina. ** La vacuna MMR combina la protección contra estas enfermedades.